

new artikel izzah.docx

by Gunawan Awal

Submission date: 20-Jun-2024 10:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 2389347019

File name: new_artikel_izzah.docx (83.25K)

Word count: 5047

Character count: 32832

EFEKTIVITAS KOMBINASI EKSTRAK DAUN KOL BANDA (*Pisonia alba* S.) dan DAUN INSULIN (*Smallanthus sonchifolius*) TERHADAP PENURUNAN GLUKOSA DARAH PADA MENCIT JANTAN (*Mus musculus*)

*Effectiveness Of The Combination Of Banda Cabbage Leaf (*Pisonia Alba* S.) And Insulin Leaf (*Smallanthus Sonchifolius*) On Reducing Blood Glucose In Male Mice (*Mus musculus*)*

Izzah Farhana , Rusdiaman , Asmawati
Poltekkes Kemenkes Makassar

*E-mail korespondensi penulis

ABSTRACT

*Banda Cabbage Leaf (*Pisonia Alba* S.) and Insulin Leaf (*Smallanthus Sonchifolius*). It [5] known to contain chemical compounds of alkaloids, tannins and flavonoids. These compounds can naturally lower blood glucose levels. This study aims to determine the effectiveness of the combination of Banda Cabbage Leaf and Insulin Leaf extract on reducing blood glucose levels in mice after being induced by glucose. Banda Cabbage Leaves and Insulin Leaves were extracted using maceration method, then evaporated using a rotaryevaporator. Twenty-one mice weighing 20±0 kg were divided into seven groups, namely the group and obtained the average result of the presentation of a decrease in mouse blood glucose levels at the 120th minute of administration, namely group I given Na-CMC 1% as a negative control showed an average percentage decrease of 34,66% and in group II given glibenclamide as a positive control the average percentage of reduction was 63,81%, in group III given 0% Banda Cabbage Leaf extract: 10% Insulin leaves had a percentage decrease of 58,81%, in group IV Banda Cabbage Leaves 7%: 3% Insulin leaves had a percentage decrease of 54,94%, group V Banda cabbage leaves 5% : Insulin leaves 5% had a percentage decrease of 39,86%, group VI Banda cabbage leaves 3% : Insulin leaves 7% had a percentage decrease of 50,40%, group VII Banda cabbage leaves 10% : Insulin leaves 0% had a percentage decrease of 51,11%. Based on percentage results for all treatments, the most optimal in lowering blood glucose levels of test animals was 10% Insulin Leaf extract given singly.*

Keywords : Blood Glucose levels, Banda Cabbage Leaf, Insulin Leaf, Mice

ABSTRAK

Daun Kol Banda (*Pisonia Alba* S.) dan Daun Insulin (*Smallanthus Sonchifolius*). Diketahui mengandung senyawa kimia alkaloid, tanin dan flavonoid. Senyawa tersebut secara alami dapat menurunkan kadar glukosa darah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kombinasi Daun Kubis Banda dan Ekstrak Daun Insulin terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit setelah diinduksi glukosa. Daun Kubis Banda dan Daun Insulin dicampur menggunakan metode maserasi, kemudian diuapkan menggunakan rotaryevaporator. Dua puluh satu ekor mencit dengan berat badan 20-30 kg dibagi menjadi tujuh kelompok yaitu kelompok dan diperoleh rata-rata hasil persentase penurunan kadar glukosa darah mencit pada menit ke 120 pemberian yaitu kelompok I yang diberi Na-CMC 1%. sebagai kontrol negatif menunjukkan rata-rata persentase penurunan sebesar 34,66% dan pada kelompok II yang diberikan glibenklamid sebagai kontrol positif rata-rata persentase penurunannya sebesar 63,81%, pada kelompok III diberikan ekstrak Daun Kubis Banda 0% : Daun Insulin 10%. mengalami persentase penurunan sebesar 58,81%, pada kelompok IV Daun Kubis Banda 7% : Daun Insulin 3% mengalami persentase penurunan sebesar 54,94%, kelompok V Daun Kubis Banda 5% : Daun Insulin 5% mengalami persentase penurunan sebesar 39,86%, kelompok VI Daun kubis banda 3% : Daun insulin 7% mengalami persentase penurunan sebesar 50,40%, kelompok VII Daun kubis banda 10% : Daun insulin 0% mengalami persentase penurunan sebesar 51,11%. Berdasarkan hasil persentase seluruh perlakuan, yang paling optimal dalam menurunkan kadar glukosa darah hewan uji adalah ekstrak Daun Insulin 10% yang diberikan secara tunggal.

Kata kunci : Gula darah, Daun Kol Banda (*Pisonia Alba* S.), Daun Insulin, Mencit.

PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa tercatat 422 juta orang di dunia menderita diabetes melitus atau terjadi peningkatan sekitar 8,5 % pada populasi orang dewasa dan diperkirakan terdapat 2,2

juta kematian dengan presentase akibat penyakit diabetes melitus yang terjadi sebelum usia 70 tahun. Bahkan diperkirakan akan terus meningkat sekitar 600 juta jiwa pada tahun 2035 (Kemenkes RI, 2018). Hasil Riskesdas 2018 menyatakan bahwa prevalensi diabetes di Indonesia berdasarkan dengan diagnosis dokter pada kalangan umur ≥ 15 tahun sebanyak 2 % meningkat dibandingkan hasil riskerda 2013 yaitu sebesar 1,5%. Semua provinsi menunjukkan peningkatan kasus pada tahun 2013-2018, kecuali provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) (Riskesda 2018).

3

Diabetes Mellitus (DM) dikenal dengan istilah penyakit gula atau kencing manis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi (hiperglikemia) akibat kegagalan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Penyakit Diabetes Mellitus bersifat kronis dan jumlah penderitanya terus meningkat diseluruh dunia seiring dengan bertambahnya jumlah populasi, usia, prevalensi obesitas dan penurunan efektivitas fisik (Somalangi et al., 2022).

Diabetes mellitus dapat diobati dengan pengobatan klinis dan tradisional. Salah satu obat yang digunakan untuk mengobati diabetes mellitus adalah glibenklamid. Diabetes melitus juga dapat diatasi dengan pengobatan alami dengan memanfaatkan tanaman berkhasiat obat. Masyarakat cenderung beralih ke tanaman tradisional karena kelebihan dari tanaman obat adalah aman dikonsumsi, efektif menyembuhkan penyakit dengan efek samping yang lebih sedikit serta mudah didapat. Oleh karena itu, pengobatan tradisional dengan tanaman obat menjadi langkah alternatif untuk mengatasinya, salah satunya tanaman Daun Kol Banda dan Daun Insulin (Fajriana, 2022).

Ekstrak Daun Insulin dapat menurunkan kadar glukosa darah. Selain itu tanaman lain yang juga telah terbukti memiliki potensi sebagai antidiabetes adalah Daun Kol Banda (*Pisonia alba* S.). Dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh (Sunil et al., 2009) menyatakan bahwa Daun tanaman Kol Banda dapat berfungsi sebagai bahan anti diabetes karena kandungan zat ethanolik dapat menghambat kerja enzim α -glukosidase. Enzim ini berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa dalam tubuh. Dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh (Uppugalla et al., 2022) menyatakan bahwa Daun tanaman Kol Banda digunakan sebagai antidiabetes dalam pengobatan tradisional India. Selain itu, tanaman lain yang juga telah terbukti memiliki potensi sebagai antidiabetes adalah Daun Insulin. Andy Brata dan Lailan Azizah dalam penelitiannya pada tahun 2022 (Brata et al., 2022) menyatakan bahwa Daun Insulin dapat mengontrol kadar gula darah melalui mekanisme perbaikan fungsi pangreas di dalam memproduksi insulin karena kandungan antioksidannya. Daun Insulin mengandung senyawa seskuiterpen lakton, senyawa fenolik seperti flavonoid dan terpenoid, alkaloid, tanin, saponin, dan fenol (Sari et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai potensi antidiabetes kombinasi antara Daun Kol Banda (*Pisonia alba* S.) dengan Daun Insulin (*Smallanthus sonchifolius*). Peneliti ingin mengetahui Efektivitas antidiabetes apabila kedua tanaman tersebut dikombinasikan.

METODE

Desain, tempat dan waktu

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimental untuk mengetahui efektivitas kombinasi ekstrak Daun Kol Banda (*Pisonia alba* S.) dan Daun Insulin (*Smallanthus sonchifolius*) terhadap penurunan kadar glukosa darah pada hewan uji mencit jantan (*Mus musculus*) yang Diinduksi glukosa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2023 – bulan maret 2024 di Laboratorium Fitokimia dan Laboratorium Farmakologi Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Makassar.

5

Bahan dan alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kendang mencit, botol minum mencit, waterbath, Glucometer (Nesco®), strips glucometer (Nesco®), spoilt, timbangan analitik (Aicis), timbangan kasar (Ohaus), batang pengaduk, cawan porcelin, gelas ukur, gelas beaker 1000 ml, labu ukur, wadah maserasi, rotary evaporator, kain flannel, kapas, dan gunting. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Daun Kol Banda (*Pisonia alba* S.) yang diambil di Makassar dan Daun Insulin (*Smallanthus sonchifolius*) diambil di Kab. Barru, hewan uji mencit (*Mus musculus*), glukosa, aquadeest, etanol 96%, Na.CMC 1%, dan tablet glibenklamid.

Langkah-Langkah Penelitian

1. Pengambilan dan Pengolahan Sampel

Dikumpulkan Daun Kol Banda (*Pisonia alba* S.) dan Daun Insulin (*Smallanthus sonchifolius*), setelah itu dipisahkan dari rantingnya secara manual dan dicuci bersih dengan air mengalir selanjutnya ditiriskan. Setelah ditiriskan ditimbang berat basah, kemudian dipotong-potong dengan ukuran 2-3 cm dan dikeringkan hingga kering. Selanjutnya ditimbang berat kering lalu simplicia dimasukkan kedalam wadah plastik lalu diberi etiket.

2. Pembuatan Kombinasi Ekstrak

Dalam pembuatan ekstrak kombinasi Daun Kol Banda (*Pisonia alba* S.) dan Daun Insulin (*Smallanthus sonchifolius*) dengan perbandingan konsentrasi, (Kol Banda 0% : Insulin 100%) ; (Kol Banda 70% : Insulin

30%) ; (Kol Banda 50% : Insulin 50%) ; (Kol Banda 30% : Insulin 70%) ; (Kol Banda 100 % : Insulin 0%). Dilakukan dengan metode maserasi dengan pelarut etanol 96%. Ditimbang simplisia Daun Kol Banda dan Daun Insulin sebanyak 250 g kemudian dituang pelarut kedalam wadah maserasi hingga simplisia terendam. Kemudian direndam selama 3 hari pada suhu ruang (25°C) dengan dilakukan pengadukan sesekali. Setelah itu, ekstrak disaring menggunakan kasa steril. Selanjutnya dilakukan penguapan pelarut menggunakan *rotary evaporator* sampai didapatkan ekstrak kental. Prosedur yang sama dilakukan terhadap tanaman Daun Kol Insulin.

3. Pembuatan Penginduksi Glukosa 20% b/v

Dalam penelitian ini glukosa monohidrat 20% b/v digunakan sebagai penginduksi pada mencit sehingga terjadi hiperglikemia. Prosedur pembuatan glukosa 20% b/v dengan cara sebanyak 10 gram glukosa monohidrat dimasukkan ke dalam labu ukuran 100 ml. ditambahkan aquades sebanyak 50 ml sedikit demi sedikit dan **7** kocok hingga larut. Volume dicukupkan hingga 100 ml.

4. Pembuatan Koloid Na-CMC 1 % b/v

Dalam pembuatan larutan koloid Na-CMC 1 % b/v digunakan sebagai kontrol negatif tujuannya agar potensi penurunan kadar glukosa darah sampel dapat terlihat lebih jelas. Ditimbang Na-CMC sebanyak 3 g, disiapkan lumpang kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit kedalam aquadest panas dengan (suhu 70°C) sambil diaduk hingga terbentuk homogen kemudian dimasukkan kedalam gelas ukur dan cukupkan volumenya hingga 300 ml dengan aquadest (Abasa et al., 2024).

5. Pembuatan Suspensi Glibenklamid

Dalam penelitian ini suspensi Glibenklamid digunakan sebagai kontrol positif yang merupakan obat antiabetik oral memiliki efek hipoglikemik yang kuat dengan dosis rendah. Prosedur pembuatan suspensi Glibenklamid dengan 1 tablet kemudian digerus kedalam lumpang hingga homogen. Setelah itu, ditimbang 37,3mg glibenklamid. Dimasukkan kembali kedalam lumpang dan ditambahkan dengan larutan Na-CMC 1% b/v sedikit demi sedikit sambil digerus hingga homogen. Kemudian dimasukkan dalam gelas ukur 100 ml kemudian volumenya dicukupkan dengan larutan NaCMC 1% b/v hingga 100 ml (Jumain et al., 2019).

6. Pembuatan Suspensi Ekstrak Etanol

a. Suspensi ekstrak etanol Daun Kol Banda 0% b/v ditambah Daun Insulin 100% b/v.

Ditimbang ekstrak etanol Daun Insulin sebanyak 100 mg didispersikan ke dalam koloid Na-CMC 1% b/v kemudian dicukupkan volumenya dengan Na-CMC % b/v hingga 10 ml.

b. Suspensi ekstrak etanol Daun Kol Banda 70% b/v ditambah Daun Insulin 30% b/v.

Ditimbang ekstrak etanol Daun Kol Banda sebanyak 700 mg dan ekstrak etanol Daun Insulin 300 mg, didispersikan ke dalam koloid Na-CMC 1% b/v kemudian dicukupkan volumenya dengan Na-CMC % b/v hingga 10 ml.

c. Suspensi ekstrak etanol Daun Kol Banda 50% b/v ditambah Daun Insulin 50% b/v.

Ditimbang ekstrak etanol Daun Kol Banda sebanyak 500 mg dan ekstrak etanol Kol Insulin 500 mg, didispersikan ke dalam koloid Na-CMC 1% b/v kemudian dicukupkan volumenya dengan Na-CMC % b/v hingga 10 ml.

d. Suspensi ekstrak etanol Daun Kol Banda 30% b/v ditambah Daun Insulin 70% b/v.

Ditimbang ekstrak etanol Daun Kol Banda 300 mg, dan Daun Insulin sebanyak 700 mg, didispersikan ke dalam koloid Na-CMC 1% b/v kemudian dicukupkan volumenya dengan Na-CMC % b/v hingga 10 ml.

e. Suspensi ekstrak etanol Daun Kol Banda 100% b/v ditambah Daun Insulin 0 % b/v.

Ditimbang ekstrak etanol Daun Kol Banda sebanyak **6** 100 mg, didispersikan ke dalam koloid Na-CMC 1% b/v kemudian dicukupkan volumenya dengan Na-CMC % b/v hingga 10 ml.

7. Perlakuan terhadap Hewan Uji

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit jantan (*Mus musculus*), berbadan sehat dengan bobot 20-30 gram yang berasal dari Desa Temmappadduae. Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Sebelum perlakuan, semua hewan uji dipuaskan kurang lebih 12 jam dan tetap diberi minum. Selanjutnya ditimbang berat badannya, lalu dikelompokkan, masing-masing kelompok terdiri atas 3 ekor mencit yaitu K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7.

Tiap-tiap mencit jantan sebelum perlakuan, diperiksa kadar glukosa darah mencit yang diambil pada ekor. Kemudian mencit diinduksi dengan menggunakan glukosa secara oral pada tiap mencit, setelah 30 menit dilakukan pengukuran kadar glukosa darah mencit sesudah pemberian induksi.

Mencit dibagi menjadi 7 kelompok perlakuan, dengan pembagian kelompok sebagai berikut:

Kelompok I : Diberi kontrol negatif larutan Na.CMC 1% secara oral yang terdiri dari mencit I, II, dan III

Kelompok II : Diberikan kontrol positif suspensi glibenklamid secara oral untuk mencit IV, V, dan VI

Kelompok III : Diberikan Suspensi ekstrak etanol Daun Kol Banda 0% b/v ditambah Daun Kol

- Kelompok IV : Insulin 100% b/v secara oral untuk mencit VII, VIII dan IX
 : Diberikan Suspensi ekstrak etanol Daun Kol Banda 70% b/v ditambah Daun Kol
 Insulin 30% b/v secara oral untuk mencit X, XI, dan XII
- Kelompok V : Diberikan Suspensi ekstrak etanol Daun Kol Banda 50% b/v ditambah Daun Insulin
 50% b/v secara oral untuk mencit XIII, XIV dan XV
- Kelompok VI : Diberikan Suspensi ekstrak etanol Daun Kol Banda 30% b/v ditambah Daun Insulin
 70% b/v secara oral untuk mencit XVI, XVII dan XVIII
- Kelompok VII : Diberikan Suspensi ekstrak etanol Daun Kol Banda 100% b/v ditambah Daun Insulin
 0% b/v secara oral untuk mencit XIX, XX dan XXI
8. Penentuan Kadar Glukosa darah
 Sebelum pengambilan kadar glukosa darah lebih dahulu glukometer diaktifkan kemudian strip dimasukkan ke dalam glukometer. Ekor mencit desinfeksi dengan alkohol 70%, selanjutnya diukur kadar glukosa darah pada ujung ekor mencit dan ditetaskan pada strip glukometer, dalam waktu 10 detik kadar glukosa darah akan terbaca pada monitor glukometer.
9. Pengamatan dan Pengumpulan Data
 Pengamatan pertama dilakukan sebelum eksperimen untuk mengetahui kadar glukosa darah normal mencit jantan. Pengamatan kedua dilakukan setelah 30 menit pemberian glukosa, untuk mengetahui peningkatan kadar glukosa darah mencit. Pengamatan lainnya adalah pengukuran suhu untuk mengetahui efek perlakuan yang dilakukan 30', 60', 90', 120' menit setelah perlakuan.

Pengolahan dan analisis data

Data yang diperoleh dari pengamatan kadar glukosa darah mencit setelah perlakuan kemudian dianalisis secara statistik dengan menggunakan SPSS 25 dengan menggunakan metode *One way Anova*.

HASIL

Tabel 4.1 Berat Ekstrak Daun Kol Banda (*Pisonia alba S.*) dan Daun Insulin (*Smallanthus sonchifolius*)

| Sampel | Jenis Pelarut | Metode Maserasi | Berat Sampel Kering | Berat Ekstrak | Rendemen | Literatur |
|---|---------------|-----------------|---------------------|---------------|----------|---|
| Daun Kol Banda (<i>Pisonia alba S.</i>) | Etanol 96% | Maserasi | 250 g | 29,5 g | 11,8% | ≥ 10% (Farmakope herbal Indonesia, 2017) |
| Daun Insulin (<i>Smallanthus sonchifolius</i>) | Etanol 96% | Maserasi | 250 g | 33,1 g | 13,24% | |

(Sumber : Data primer, 2024)

Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Kadar Glukosa Darah pada Mencit yang Diinduksi Glukosa

| | Kadar Glukosa Darah Setelah |
|--|-----------------------------|
| | |

| Kelompok | Replikasi | Berat | Darah | Induksi | Pemberian (mg/dL) | | | |
|---------------|------------|-------|-------|---------|-------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | Menit | Menit | Menit | Menit |
| | | | | | 30 | 60 | 90 | 120 |
| (mg/dL) | | | | | | | | |
| | I | 27 | 116 | 182 | 89 | 100 | 89 | 125 |
| Kontrol (-) | II | 26 | 73 | 186 | 100 | 89 | 90 | 122 |
| Na-CMC | III | 28 | 100 | 196 | 159 | 108 | 108 | 121 |
| | Jumlah | | 289 | 564 | 348 | 297 | 287 | 368 |
| | Rata-rata | | 96,3 | 188 | 116 | 99 | 95,6 | 122,6 |
| | I | 34 | 90 | 264 | 64 | 50 | 55 | 87 |
| Kontrol (+) | II | 33 | 90 | 236 | 49 | 47 | 43 | 89 |
| Glibendclamid | III | 34 | 92 | 256 | 73 | 56 | 51 | 97 |
| | Jumlah | | 272 | 756 | 186 | 153 | 149 | 273 |
| | Rata-rata | | 90,6 | 252 | 62 | 51 | 49,6 | 91 |
| | I | 30 | 123 | 240 | 164 | 81 | 111 | 102 |
| Ekstrak | II | 29 | 75 | 238 | 133 | 73 | 98 | 96 |
| DKB 0% : | III | 30 | 108 | 216 | 105 | 53 | 85 | 88 |
| DI 10% | Jumlah | | 306 | 694 | 402 | 207 | 294 | 286 |
| | Rtata-rata | | 102 | 231,3 | 134 | 69 | 98 | 95,3 |
| | I | 31 | 119 | 246 | 86 | 57 | 66 | 99 |
| Ekstrak | II | 31 | 93 | 186 | 139 | 84 | 96 | 96 |
| DKB 7 % : | III | 32 | 97 | 217 | 111 | 82 | 82 | 94 |
| DI 3% | Jumlah | | 309 | 649 | 336 | 223 | 224 | 289 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Rata-rata | 103 | 216,3 | 112 | 74,3 | 81,3 | 96,3 |
| | I | 28 | 74 | 181 | 109 | 85 | 121 |
| Ekstrak | II | 28 | 59 | 195 | 99 | 79 | 111 |
| DKB 5% : | III | 28 | 90 | 173 | 104 | 84 | 91 |
| DI 5% | Jumlah | | 223 | 549 | 312 | 248 | 246 |
| | Rata-rata | | 74,6 | 183 | 104 | 82,6 | 110 |
| | I | 30 | 102 | 223 | 147 | 114 | 147 |
| Ekstrak | II | 26 | 95 | 189 | 116 | 89 | 85 |
| DKB 3% : | III | 30 | 82 | 205 | 149 | 102 | 87 |
| DI 7% | Jumlah | | 279 | 617 | 412 | 305 | 319 |
| | Rata-rata | | 93 | 205,6 | 137,3 | 101,6 | 106,3 |
| | I | 33 | 92 | 207 | 155 | 100 | 82 |
| Ekstrak | II | 31 | 155 | 213 | 122 | 95 | 94 |
| DKB 10% : | III | 32 | 82 | 198 | 144 | 111 | 105 |
| DI 0% | Jumlah | | 329 | 618 | 421 | 306 | 281 |
| | Rata-rata | | 109,6 | 206 | 104,3 | 102 | 93,6 |
| | | | | | | | 100,3 |

(Sumber : Data primer, 2024)

Tabel 4.3 Persentase Penurunan Kadar Glukosa Darah pada Mencit (*Musmusculus*) Diinduksi glukosa.

| Replikasi | Percentase Penurunan Kadar Glukosa Darah Mencit (%) | | | | | | |
|-----------|---|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | Kontrol (-) Na- CMC | Kontrol (+) Glibenkl amid | Ekstrak DKB 0% : DI 10% | Ekstrak DKB 7% : DI 3% | Ekstrak DKB 5% : DI 5% | Ekstrak DKB 3% : DI 7% | Ekstrak 10% : DI 0% |
| 1 | 31.32 | 67.05 | 57.5 | 59.76 | 33.15 | 53.81 | 47.34 |
| 2 | 34.41 | 62.29 | 59.66 | 48.39 | 43.08 | 47.62 | 54.46 |
| 3 | 38.27 | 62.11 | 59.26 | 56.68 | 43.35 | 49.76 | 51.52 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Rata-Rata | 34.66 | 63.81 | 58.81 | 54.94 | 39.86 | 50.40 | 51.11 |
| STDEV | ± 2.46 | ± 2.29 | ± 0.94 | ± 4.80 | ± 4.75 | ± 2.57 | ± 2.92 |

(Sumber : Data primer, 2024)

PEMBAHASAN

Diabetes melitus merupakan kondisi medis yang dipicu oleh kelainan dalam metabolisme yang terjadi di pankreas. Karakteristik utama dari kondisi ini adalah peningkatan kadar gula darah, yang disebut sebagai hiperglikemias, yang mungkin muncul karena kurangnya produksi insulin, resistensi insulin, atau kedua faktor tersebut. Pada penelitian ini peningkatan kadar glukosa darah pada mencit dilakukan dengan cara pemberian glukosa. Kemudian diberikan perlakuan untuk mengetahui pemberian ekstrak Daun Kol Banda (*Pisonia alba S.*) dan Daun Insulin (*Smallanthus sonchifolius*) dengan berbagai macam dosis, glibenklamid sebagai kontrol positif dan Na-CMC sebagai kontrol negatif.

Daun Kol Banda dan Daun Insulin dipisahkan dari rantingnya kemudian dikeringkan lalu dipotong-potong hingga ukurannya lebih kecil. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kadar air dan memperkecil ukuran partikel simpisia serta memperluas permukaannya sehingga memudahkan pelarut untuk berpenetrasi dan menarik senyawa metabolit sekunder dari tanaman tersebut. Proses maserasi dilakukan selama 3 hari dengan sesekali pengadukan. Selanjutnya ekstrak cair yang dihasilkan dikentalkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 60°C. Menggunakan suhu 60 derajat karena suhu tersebut paling umum digunakan dan juga senyawa metabolit sekunder tidak rusak pada suhu tersebut. Dalam penelitian ini dihasilkan rendemen ekstrak daun kol banda sebesar 11,8% dan daun insulin sebesar 13,24% dimana hasil tersebut memenuhi persyaratan rendemen ekstrak berdasarkan farmakope herbal Indonesia tahun 2017.

Ekstrak kental yang dihasilkan akan dikombinasikan dengan variasi konsentrasi untuk diinduksi ke dalam tubuh mencit. Dalam penelitian ini digunakan mencit sebagai hewan uji karena memiliki kelebihan seperti siklus hidup relatif pendek, banyaknya jumlah anak per kelahiran, mudah ditangani, memiliki karakteristik reproduksi yang mirip dengan hewan mamalia lain, struktur anatomi, fisiologi serta genetik yang mirip dengan manusia (Mutiarahmi et al., 2021). Pemilihan jenis kelamin jantan karena didasarkan pada pertimbangan bahwa 32 mencit jantan tidak memiliki hormon estrogen, kalaupun ada hanya dalam jumlah yang relatif sedikit. Memiliki kondisi hormonal yang lebih stabil dibandingkan dengan mencit betina yang mengalami perubahan hormonal pada masa kehamilan dan menyusui. Selain itu tingkat stres pada mencit betina lebih tinggi dibandingkan dengan mencit jantan (Juwita et al., 2017).

Sebelum dilakukan pengujian, hewan uji terlebih dahulu dipuaskan untuk mengetahui kadar glukosa darah mencit yang sebenarnya pada pemeriksaan kadar glukosa sebelum mencit mendapat perlakuan dimana kadar glukosanya tidak dipengaruhi oleh apa yang telah dikonsumsi mencit. Kadar gula darah mencit dikatakan masih normal apabila berada dalam kisaran 75-128 mg/dl (Sahetapy et al., 2021). Hewan uji diinduksi menggunakan glukosa agar kadar glukosa darahnya meningkat dari keadaan normal, perlakuan ini akan menyebabkan terjadinya intoleransi glukosa pada mencit dan sel β pankreas tidak sensitif terhadap adanya peningkatan kadar glukosa darah sehingga pelepasan insulin dalam tubuh mencit akan berkurang. Kejadian tersebut menyebabkan kebutuhan obat yang dapat meningkatkan sensitivitas pankreas untuk melepaskan insulin. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan glibenklamid sebagai pembanding. Obat ini merupakan salah satu obat golongan sulfonilurea yang reseptornya terdapat dalam pankreas, bekerja dengan cara berikatan dengan reseptornya dan merangsang granula insulin untuk melepaskan insulin sehingga dapat menurunkan kadar gula darah. Adapun penggunaan darah sebagai sampel karena glukosa akan banyak terakumulasi di dalam darah (Hananti et al., 2018).

Berdasarkan tabel hasil penelitian (tabel 4.3), pada perlakuan kontrol negatif setelah diinduksi dengan Na-CMC 1% terjadi penurunan kadar gula darah mencit pada menit ke-30 dan 90, dan mengalami peningkatan pada menit ke-60 dan menit ke-120 namun masih pada kisaran normal kadar gula darah mencit dan menunjukkan adanya penurunan dari proses induksi hingga menit ke-120 sebesar 34,66% ($STDEV \pm 2,46$). Hewan uji yang diinduksi suspensi glibenklamid menunjukkan penurunan kadar gula darah yang signifikan pada menit ke-30 dengan rata-rata kadar gula darah yang terus menurun hingga menit ke-90 lalu meningkat pada menit ke-120 namun masih dalam batas normal gula darah mencit. Suspensi glibenklamid dapat menurunkan kadar gula darah mencit sebesar 63,81% ($STDEV \pm 2,29$) pada menit ke-120. Adapun hewan uji yang diberikan ekstrak daun insulin 100% secara tunggal memperlihatkan penurunan kadar gula darah pada menit ke-30 hingga menit ke-60 dan mengalami peningkatan pada menit ke-90 hingga menit ke-120 namun masih pada batas normal kadar gula darah. Daun insulin yang diinduksikan secara tunggal mampu menurunkan kadar gula darah mencit sebesar 58,81% ($STDEV \pm 0,94$) pada menit ke-120.

Selanjutnya pada kelompok perlakuan yang keempat yaitu kombinasi daun kol banda 70% dengan daun insulin 30% juga menunjukkan adanya penurunan kadar gula darah pada hewan uji yang terus terjadi hingga menit ke-60 namun terjadi peningkatan pada menit ke-90 hingga menit ke-120 tetapi masih pada batas normal kadar gula darah, pada perlakuan ini mampu menurunkan kadar gula darah hewan uji sebesar 54,94% ($STDEV \pm 4,80$)

dimana angka tersebut lebih rendah jika dibanding dengan persen penurunan glibenklamid dan ekstrak daun insulin 10% yang diberikan secara tunggal. Pada perlakuan kelompok 5 yaitu daun kol banda 50% dengan daun insulin 50% menunjukkan adanya penurunan yang terus terjadi hingga menit ke-90 dan mengalami peningkatan pada menit ke-120 namun masih pada batas normal kadar gula darah mencit. Kombinasi ini mampu menurunkan kadar gula darah mencit sebesar 39,86% ($STDEV \pm 4,75$). Adapun pada perlakuan kelompok 6 yaitu kombinasi daun kol banda 30% dengan daun insulin 70% menunjukkan adanya penurunan kadar gula darah secara signifikan pada menit ke-3- dan kadar gula darah naik turun hingga menit ke-120 namun masih normal. Kombinasi ini mampu menurunkan kadar gula darah hewan uji sebesar 50,40% ($STDEV \pm 2,57$) pada menit ke-120.

Adapun perlakuan pada kelompok 7 yaitu daun kol banda 100% yang diberikan secara Tunggal menunjukkan adanya penurunan kadar glukosa darah yang terus terjadi hingga menit ke-90 namun penurunannya lambat dan mengalami peningkatan pada menit ke-120. Perlakuan ini mampu menurunkan kadar glukosa darah mencit sebesar 51,11% ($STDEV \pm 2,92$). Persentase penurunan kadar glukosa darah pada perlakuan kelompok 6 dan 7 memiliki persentase yang hampir sama namun masih rendah dibanding kontrol positif dan perlakuan pada kelompok 3. Hasil pengukuran kadar gula darah menunjukkan rata-rata penurunana kadar gula darah yang tidak menurun secara terus menerus dari menit ke-30 hingga menit ke-120, nilainya turun pada menit tertentu dan naik pada menit tertentu disetiap perlakuan namun masih pada batas normal kadar gula darah mencit. Adanya peningkatan glukosa darah juga terjadi karena efek glukosa masih bekerja pada saat pengukuran kadar glukosa akhir.

Bervariasinya penurunan kadar glukosa darah pada masing-masing kelompok pada waktu yang sama disebabkan oleh faktor non fisik dan lingkungan, seperti adanya stress pada mencit karena seperti pengukuran kadar glukosa darah yang dilakukan secara berulang-ulang. Selain itu variasi terjadi karena terdapat keragaman kepekaan pada setiap hewan akibat perbedaan biologik.

Berdasarkan hasil diatas, dapat dikatakan bahwa semua perlakuan yang diberikan untuk menurunkan kadar glukosa darah pada hewan uji baik diberikan secara tunggal maupun kombinasi antara ekstrak daun kol banda dengan daun insulin mampu menurunkan kadar gula darah pada mencit. Adanya kemampuan menurunkan kadar glukosa darah pada ekstrak Daun Kol Banda dan Daun Insulin diduga karena adanya senyawa aktif flavonoid untuk menurunkan kadar gula darah dan menghambat alfa enzim glukosidase dan enzim amilase sehingga pemecahan karbohidrat menjadi monosakarida menjadi gagal dan glukosa tidak dapat diserap oleh usus yang menyebabkan terjadi penurunan kadar glukosa dalam darah (Utami et al., 2020).

Namun jika melihat besarnya persentase kemampuan ekstrak untuk menurunkan kadar gula darah mencit pada masing-masing perlakuan maka ekstrak daun insulin 100% yang diberikan secara tunggal memiliki hasil paling baik. Adapun ekstrak daun kol banda 100% yang diberikan secara tunggal memiliki persentase penurunan yang paling rendah.

Selanjutnya, data atau hasil presentase yang ¹³ diperoleh kemudian dilakukan analisis statistik menggunakan SPSS 25. Pada uji normalitas didapatkan nilai signifikansi ($p > 0,05$) yang berarti data terdistribusi dengan **normal** sehingga dapat dilanjutkan untuk Uji Anova. Hasil uji Anova diperoleh nilai signifikansi ($p < 0,05$) menunjukkan bahwa ada perbedaan yang bermakna antara tiap konsentrasi.

Dalam analisis statistik, uji ANOVA (Analysis of Variance) digunakan untuk membandingkan rata-rata dari tiga atau lebih kelompok untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok tersebut. Ketika hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok tersebut, kita menyebutnya sebagai "perbedaan yang bermakna".

KESIMPULAN

Hasil uji Anova diperoleh nilai signifikansi ($p < 0,05$) menunjukkan bahwa ada perbedaan yang bermakna antara tiap konsentrasi. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Ekstrak Daun Insulin memberikan efek penurunan kadar Glukosa darah pada mencit dengan konsentrasi ekstrak Daun Insulin 10% yang diberikan secara tunggal konsentrasi yang paling optimal yaitu dengan kemampuan menurunkan kadar glukosa darah pada mencit sebesar 58,81%.

SARAN

Mengingat adanya keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini maka diperlukan penelitian lebih lanjut dengan kontrol dan penginduksi yang lain untuk mengetahui secara lebih terperinci efek penurunan glukosa darah ekstrak Daun Kol Banda (*Pisonia alba* S.) dan Daun Insulin (*Smallanthus sonchifolius*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abasa, S., Pancasakti, U., Ishak, P., & Pancasakti, U. (2024). *Journal Pharmacy And Application* Pengaruh Pemberian Ekstrak Etanol Akar Pinang (*Areca catechu L.*) Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah Mencit (*Mus musculus*) Effect Of Ethanolic Extract Of Betel Nut Root (*Areca catechu L.*) To Reduction Of Mice (*Mus* . 2(1).

Amanatie, Sulistyowati, E. 2015. *Structure Elucidation of the Leaf of Tithonia diversifolia (Hemsl)* Gray. Jurnal

Sains dan Matematika. Vol. 23 (4) : 101-106.

Anonim. (1979). *Farmakope Indonesia*, Edisi III.

Aulannisa, F., Jannah, I. N., Wulandari, E. A., Oktaviani, V. C., & Saputri, E. (2021). Systematic Review Perbandingan Efektifitas Daun Insulin (*Smallanthus sonchifolius*) dan Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) dalam Penurunan Kadar Gula Darah Tikus Diabetes. *Generics: Journal of Research in Pharmacy*, 1(2), 70–78. <https://doi.org/10.14710/genres.v1i2.11148>

Aulia, R. (2022). Uji Aktivitas Analgetik Ekstrak Etanol Kulit Buah Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) Pada Mencit Putih Jantan (*Mus musculus*)= Analgesic Activity Of Ethanolic Extract Of Jackfruit Rind (*Artocarpus heterophyllus* L.) In Male Ehite Mice (*Mus musculus*).

Brata, A., & Azizah, L. (2022). Penurunan Kadar Gula Darah Mencit Putih Jantan Dengan Menggunakan Hasil Fraksinasi Daun Insulin. *Jurnal Pharmacopoeia*, 1(2), 52–65. <https://doi.org/10.33088/jp.v1i2.207>

Care, D., & Suppl, S. S. (2019). *Introduction : Standards of Medical Care in Diabetes d 2019*. 42(January), 2018–2019.

Denggos, Y. (2023). Penyakit Diabetes Mellitus Umur 40-60 Tahun di Desa Bara Batu Kecamatan Pangkep. *Healthcaring: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 2(1), 55–61. <https://doi.org/10.47709/healthcaring.v2i1.2177>

Fakhruzy, Kasim, A., Asben, A., & Anwar, A. (2020). Review: Optimalisasi Metode Maserasi Untuk Ekstraksi Tanin Rendemen Tinggi. *MENARA Ilmu*, XIV(2), 38–40.

Hananti, R. S., Hidayat, S.-, & Yanti, L.-. (2018). Uji Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Etanol Kulit Kayu Manis (*Cinnamomum burmanii* Nees ex Bl.) Dibandingkan Dengan Glibenklamid Pada Mencit Jantan Galur Swiss Webster Dengan Metode Toleransi Glukosa. *Jurnal Sains Dan Teknologi Farmasi Indonesia*, 1(1), 13–21. <https://doi.org/10.58327/jstfi.v1i1.10>

Hardjana, A. C., Boy, B., Sidharta, R., & Purwiantiningsih, L. M. E. (2016). *Antibacterial Activity Of Kol Banda (Pisonia albaSpan) Leaveextractsagainst Pseudomonas aeruginosa AND Staphylococcus aureuswithsolvent Variations*.

Jumain, J., Asmawati, A., Farid, F. T., & Riskah, R. (2019). Efek Sari Buah Kersen (*Muntingia Calabura* L.) Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Mencit (*Mus Musculus*). *Media Farmasi*, 15(2), 156-162.

Jumasna. (2022). *Pengaruh Jenis Cairan Penyari Dalam Maserasi Terhadap Kadar Kumarin Total Dan Analisis Profil Klt-Densitometri Ekstrak Buah Mengkudu (Morinda citrifolia L.)*.

Juwita, R., Saleh, C., & Sitorus, S. (2017). Uji Aktivitas Antihiperurisemia dari Daun Hijau Tanaman Pucuk Merah (*Syzygium myrtifolium* Walp.) Terhadap Mencit Jantan (*Mus Musculus*). *Jurnal Atomik*, 2(1), 162–168.

Lestari, D. A. (2021). Uji Efek Ekstrak Kulit Buah Langsat (*Lansium domesticum*) terhadap Penurunan Kadar Gula Darah pada Mencit (*Mus musculus*). 7.


Lestari, Zulkarnain, & Sijid, S. A. (2021). Diabetes Melitus: Review Etiologi, Patofisiologi, Gejala, Penyebab, Cara Pemeriksaan, Cara Pengobatan dan Cara Pencegahan. *UIN Alauddin Makassar*, November, 237–241.

Mutiarahmi, C. N., Hartady, T., & Lesmana, R. (2021). Use of Mice As Experimental Animals in Laboratories That Refer To the Principles of Animal Welfare: a Literature Review. *Indonesia Medicus Veterinus*, 10(1), 134–145. <https://doi.org/10.19087/imv.2020.10.1.134>

Nurul, I., Kulsum, S., Suryana, S., & Soni, D. (n.d.). *Jurnal Sains dan Kesehatan*. 4(2), 205–213.

Pahlawan, P. P., & Dwita, O. (2016). The Effect of Insulin Leaves (*Smallanthus sonchifolius*) as Antidiabetic. *Jurnal Majority*, 5(4), 133–137.

- Panjasisih Susmiarsih, T., Kenconoviyati, K., & Kuslestari, K. (2018). Potensi Ekstrak Daun Teh Hijau terhadap Morfologi dan Motilitas Spermatozoa Tikus Putih (*Rattus norvegicus*) setelah Paparan Asap Rokok. *Majalah Kesehatan Pharmamedika*, 10(1), 001. <https://doi.org/10.33476/mkp.v10i1.682>
- Peres, M. (2019). *Aktivitas antifungi dari fraksi ekstrak etanol beberapa tanaman famili Asteraceae terhadap jamur trichophyton mentagrophytes*.
- Prameswari, S. A., & Handayani, I. (2022). Puff Pastry Substitusi Komposit Ikan Bawal Dan Daun Kol Banda. *Garina*, 138–153.
- Rejeki, P. S., Putri, E. A. C., & Prasetya, R. E. (2018). Ovariektomi Pada Tikus Dan Mencit. In *Airlangga University Press*.
- Riskesdas. (2018). *No Title*.
- Rosyidi, C. A. H. (2014). Efek Ekstrak Daun Insulin (*Smallanthus sonchifolia*) Terhadap Kadar Glukosa Darah, Berat Badan, Dan Kadar Trigliserida Pada Tikus diabetes strain Sprague dawley Yang Diinduksi Aloksan. *Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Program Studi Pendidikan Dokter Jakarta*.
- Sahetapy, C., Kusadhiani, I., Taihuttu, Y. M. J., Penturi, J. C., Bension, J. B., & Latuconsina, V. Z. (2021). Pengaruh Stres Akut Terhadap Kadar Gula Darah Mencit (*Mus Musculus*) Dengan Perlakuan Ekstrak Etanol Alga Cokelat (*Sargassum* sp.). *PAMERI: Pattimura Medical Review*, 3(2), 25–41. <https://doi.org/10.30598/pamerivol3issue2page26-42>
- Sari, A. R., Saraswati, T. R., & Yuniwarti, E. Y. W. (2021). Potensi Ekstrak Daun Insulin (*Tithonia diversifolia* (Hemsl.) A. Gray) Terhadap Profil Kadar Glukosa Darah, Kadar Malondialdehid dan Histologi Islet Langerhans Pankreas Tikus Putih (*Rattus norvegicus* L.) Hiperglikemik. *Jurnal Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian*, 16(1), 43. <https://doi.org/10.26623/jtphp.v16i1.4403>
- Setiawati, H., Hasyim, N., Jumain, J., & Stevani, H. (2021). Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Jambu Putih (*Syzygium malaccense* (L.) Merr. & L.M. Perry) Terhadap Pertumbuhan *Escherichia coli* dan *Streptococcus mutans*. *Media Farmasi*, 17(2), 185. <https://doi.org/10.32382/mf.v17i2.2482>
- Somalangi, I., Dewi, S. R., & Sinala, S. (2022). Efek Kombinasi Ekstrak Daun Kumis Kucing (*Orthosipon aristatus*) Dan Daun Sirsak (*Annona muricata* L.) Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Mencit (*Mus musculus*). *Media Farmasi*, 18(1), 97. <https://doi.org/10.32382/mf.v18i1.2662>
- Suhono dan Budi. (2010). Ensiklopedia flora. Jilid 1. 2010. <Http://Kin.Perpusnas.Go.Id/DisplayData.aspx?PId=123835&pRegionCode=UNTAR&pClientId=650>.
- Uppugalla, S., Rajesh, K., Surendra, A. V., Kumar, K. Y., Gayasuddin, M., Sriram, N., & Nadedkar, P. P. (2022). Effect of *Pisonia Alba* Root Extract on Cafeteria Diet-Induced Obesity in Rats. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 13(9), 3732–3739. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.459>
- Utami, N. F. (2020). Efektivitas ominasi estra etanol 96% Daun Insulin dan Daun Sirsa Sebagai Anti Hipergliemi pada Mencit Putih Jantan. *Fitofarmaka*, 10(2), 97–105.
- Wijayanti Dyah Ayu Puspita. (2019). Hubungan Konsumsi Buah, Sayur Dan Senam Dm Dengan Tekanan Darah Diabetesi Di Paguyuban Dm Puskesmas Ii Denpasar Barat. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 5–24.
- Yuszda K Salimi (2021). Universitas Negeri Gorontalo. Buku ajar: biokimia dasar 1 (pp. 57-65). NI Ischak, YK Salimi, DN Botutihe.



new artikel izzah.docx

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|------|
| 1 | digilib.unisayogya.ac.id | 1 % |
| 2 | repository2.unw.ac.id | 1 % |
| 3 | ejurnal.husadakaryajaya.ac.id | 1 % |
| 4 | journal.poltekkesjambi.ac.id | 1 % |
| 5 | www.scribd.com | 1 % |
| 6 | journal.intelekmadani.org | 1 % |
| 7 | Kasmudin Mustapa, Amalia Rizky, Minarni Rama Jura. "Pengaruh Ekstrak Tanaman Putri Malu (Mimosa pudica Linn) Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah Pada Mencit (Mus musculus)", Jurnal Akademika Kimia, 2017 Publication | <1 % |
-

| | | |
|----|--|------|
| 8 | journal.unhas.ac.id Internet Source | <1 % |
| 9 | prin.or.id Internet Source | <1 % |
| 10 | koloni.or.id Internet Source | <1 % |
| 11 | prosiding.farmasi.unmul.ac.id Internet Source | <1 % |
| 12 | text-id.123dok.com Internet Source | <1 % |
| 13 | eprints.uny.ac.id Internet Source | <1 % |
| 14 | Ariani Zaltin Okvenda, Eti Yerizel, Raveinal Yerizel, Almurdi Yerizel. "Antioxidant Effectiveness Test of Olive Oil on Malondialdehyde in Hyperglycemic Rats", Jurnal Biomedika dan Kesehatan, 2023 Publication | <1 % |

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches Off